

**ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ CẨM MINH**

Số: /CV-UBND

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Cẩm Minh, ngày tháng 03 năm 2025

*Về việc hướng dẫn phòng trừ bệnh đạo ôn
và các loại sâu bệnh trên lúa Xuân 2025*

Kính gửi:

- Cấp ủy, ban cán sự các thôn.

Hiện nay, lúa Xuân 2025 bước vào thời kỳ phân hóa đòng, sinh trưởng phát triển tốt. Qua kiểm tra đến ngày 24/03/2025 bệnh đạo ôn lá tỷ lệ bệnh nơi trung bình 3-5%, nơi cao 10-15% tập trung chủ yếu trên giống Khang dân 18, Bắc Thịnh, ... Lúa xanh tốt kèm theo lượng đạm sau bón thúc đòng có nguy cơ bệnh đạo ôn lá phát sinh, phát tán lây lan diện rộng.

Để hạn chế nguồn bệnh đạo ôn gây hại thời kỳ lúa trổ và các đối tượng sâu bệnh UBND xã hướng dẫn một số biện pháp phòng trừ như sau:

1. Bệnh đạo ôn lá: Theo dự báo của đài khí tượng thủy văn thời tiết thời gian tới âm u, độ ẩm cao, biên độ nhiệt 21-33⁰C là điều kiện thuận lợi cho bệnh đạo ôn phát sinh gây hại trên lúa. Đề nghị cấp ủy, ban cán sự các thôn chỉ đạo nhân dân thường xuyên kiểm tra đồng ruộng và hướng dẫn nhân dân phun trừ khi bệnh mới chớm xuất hiện bằng các loại thuốc đặc hiệu có hoạt chất Tricyclazole, Propiconazole, Fenoxanil, Isoprothiolane... (thuốc thương phẩm như: Filia 525 EC, Flash 75WP, Beam 75WP, Katana 20SC, Bump 650WP, Trizole 400SC, Fujon 40EC ...).

Lưu ý: Pha thuốc theo đúng hướng dẫn trên nhãn gói của nhà sản xuất. Phun 25-35 lít nước thuốc/sào.

2. Vàng lá, khô đầu lá: Hiện nay lúa có hiện tượng vàng lá, khô đầu lá, những giống có hiện tượng vàng lá nặng như Bắc thịnh, Khang dân 18, VNR20 và những diện tích gieo dày, thiếu dinh dưỡng ... Đây là hiện tượng vàng lá, khô đầu lá sinh lý do chuyển giai đoạn phân hóa đòng và gặp điều kiện bất lợi của thời tiết (Nhiệt độ 14-15⁰C trùng vào thời kỳ chuyển giai đoạn). Đây là hiện tượng sinh lý không cần sử dụng các loại thuốc BVTV.

3. Bệnh thối thân, thối gốc: Xuất hiện với tỷ lệ 3-5% tập trung chủ yếu trên các giống ADI 28, khang dân 18... Cần kiểm tra đồng ruộng phát hiện bệnh sớm phòng trừ bằng các loại thuốc sau: Xantoxin 40WP, Kasumin 2SL, Starner 20WP, Aliet 800WP... Pha theo hướng dẫn trên bao gói của nhà sản xuất.

Ngoài ra cần kiểm tra, theo dõi Rầy nâu, bệnh khô vằn để phun phòng

trừ. Đặc biệt bệnh khô vằn, sau bón thúc đòng bệnh khô vằn bắt đầu phát sinh gây hại trên các diện tích gieo dày bón thừa đạm.

Nhận được công văn đề nghị ban nông nghiệp, cấp ủy, ban cán sự các thôn chỉ đạo nhân dân kiểm tra đòng ruộng phát hiện sớm bệnh đạo ôn lá và các đối tượng sâu bệnh gây hại để hướng dẫn nhân dân phun phòng trừ kịp thời./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Đài phát thanh;
- Lưu: VT, NN.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Hữu Hợi

